



CALENDARIO SUGERIDO PARA FUMIGAR CEREZAS EN HUERTOS CASEROS

| Estado de Crecimiento | Descripción | Información Objetivo | Productos Químicos | Importante |
|---|--|---|---|--|
|  Dormancia | Antes que los brotes muestren actividad en el invierno | Para Corineo (Tiro de Munición - Shothole), gomosis bacterial. ➤ Cuando la Temperatura del día alcance 40 – 45 F. Aplique a más tardar para el mediodía, para asegurar tiempo para que seque. | ➤ Copper based products (Lilly Miller fungicida Microcop); Clorothalonil (Maxide Multi-Purpose Fungicide) | Fungicida de propósito general. Cuando se utiliza como fumigante de primavera, puede quemar los tejidos de las hojas nuevas. |
|  Dormancia Tardía | En invierno, justo cuando los brotes muestren el tejido verde. | Escamas, pulgones y ácaros que sobrevivieron durante el invierno. ➤ Cuando la Temperatura del día alcance 45 – 55 F, sin pronóstico de heladas. Termine la aplicación a más tardar al mediodía para asegurar tiempo para que seque. | ➤ Superior Horticulture Oil (Ortho Volck Oil Spray) Puede mezclarse con productos a base de azufre. Productos disponibles en una variedad de etiquetas. Siga las instrucciones de la etiqueta con cuidado para evitar daños a las plantas. | Esta es la etapa más importante de fumigación para el control de plagas. Fumigue mojado completamente el árbol. |
| Floración | Cuando las flores están abiertas. | Evite la aplicación de plaguicidas durante floración para proteger a las abejas. | | |
| Caída de Pétalos o Descascarado | Cuando las flores secas se caen de la pequeña fruta. | Tiempo crítico para el manejo de: ➤ Cenicilla Polvorienta (Powdery Mildew) ➤ Tiro de Munición (Shot Hole) ➤ Pulgones (Aphids) ➤ Escama (Scale) ➤ Orugas que se alimentan (Feeding caterpillar/larvae) | ➤ Summer Horticulture Oil** ➤ Sulfur based products** (Bonide Lime Sulfur Spray) ➤ Wettable Sulfur (Safer Garden Fungicide) ➤ Chlorothalonil (Garden Tech Daconil Fungicide Conc) ➤ Insecticidal Soap (Safer's); Esfenvalerate (Ortho BugBGone Max Garden Insect Killer); Imidacloprid (Bayer Advanced Fruit, Citrus & Vegetable Insect Control) ➤ Acetamiprid (Ortho Flower, Fruit & Vegetable Insect Killer); Imidacloprid Bayer Advanced Fruit, Citrus & Vegetable Insect Control) ➤ Spinosad (Monterey Garden Insect Spray); <i>Bacillus huringiensis</i> , <i>Bt</i> (Dipel Pro) | **Precaución no mezclar azufre con aceite. Este es un momento crítico para manejar problemas de plagas. <i>Para pulgones mojar todo el árbol.</i> |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <p>Tarde en la Primavera y el Verano</p> | <p>Mosca de la Cereza Fumigaciones preventivas deben iniciarse cuando las cerezas cambian de color verde a verde amarillo.</p> <p>*Plaga nueva de verano</p> | <p>Momento crítico para manejar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mosca de la Cereza <i>Mosca de la Cereza: Una mosca con bandas negras en alas claras. Inserta huevos bajo la cascara de la fruta. Huevos eclosionan, resultando en gusanos presentes en la fruta en la cosecha.</i> Fruta-infestada de gusanos es inaceptable, no sólo para el uso en casa, pero puede propagarse a huertos cercanos. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cenicilla Polvorienta insectos en ecloción <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La mosca Drosophila de alas manchadas (<i>Drosophila suzukii</i>)* | <ul style="list-style-type: none"> ➤ GF-120 NF Naturalyte Fruit Fly Bait <ul style="list-style-type: none"> • Formulación especial atracción selectiva para el control de la mosca de la cereza. Muy eficaz. ➤ Spinosad (Monterey Garden Insect Spray); Acetamiprid (Ortho Flower, Fruit & Vegetable Insect Killer); Esfenvalerate (Ortho BugBGone Max Garden & landscape Insect Killer); Imidacloprid (Bayer Advanced Fruit, Citrus & Vegetable Insect Control) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Summer Horticulture Oil (<i>Precaucion si esta usando productos a base de azufre</i>) ➤ Insecticidal soap (Safer's) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Spinosad (Monterey Garden Insect Spray) | <p>Mosca de la fruta es una plaga importante de las cerezas. Está presente desde mediados de mayo a finales de julio.</p> <p>Un solo gusano de la mosca de la cereza en huertas comerciales es muy grave.</p> |
| <p>Otoño</p> | <p>La fruta que se queda: Retire la fruta que queda en el árbol, póngala en bolsas de plástico negras. Deje al sol durante dos semanas para matar las larvas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Si se deja fruta en el árbol, debe fumigar los arboles 4 semanas después de la cosecha. <p>Prevención del tizón cribado (taladrillo) y gomosis bacteriana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Antes de tiempo lluvioso, generalmente octubre, fumigue con fungicidas a base de cobre como se sugiere en la sección de "Dormancia". | | | |
| <p>Información Adicional</p> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ PRECAUCIÓN: Lea muy bien esta guía. Lea las instrucciones de la etiqueta del producto cuidadosamente. Lea y siga todas las instrucciones de la etiqueta para un uso responsable de cualquier pesticida. ◆ Pulgones – Rara vez se acumulan a niveles que dañan árboles frutales de traspatio. Lávelos con el chorro de agua de la manguera, rara vez tienen que fumigar. ◆ Resistencia al Pesticida – Utilice diferentes productos durante la temporada y en las siguientes temporadas para minimizar la resistencia a las plagas. ◆ Demasiada fruta para manejar – Corte los árboles y reemplace con árboles frutales de calidad. Ayude a los productores comerciales manteniendo buen cuidado y un buen manejo de plagas para sus árboles frutales!!! ◆ Para más información – Contacte la oficina de WSU Extensión del condado de Chelan al: (509) 667-6540 o visite nuestro sitio WEB en: http://county.wsu.edu/chelan-douglas/GARDENING/MG/Pages/default.aspx ◆ Marcas Registradas – El uso de marcas registradas es solo como ejemplos. No respaldamos ningún producto. | | | |

Compilado por el programa de Horticultura Urbana de la oficina de WSU Extensión, Condado Chelan. Revisado 07/2013.

Políticas y programas de extensión son consistentes con las leyes federales, estatales y las regulaciones sobre no discriminación en cuanto a raza, color, género, origen, religión, edad, discapacidad y orientación sexual. Evidencia de incumplimiento puede ser notificada a su Oficina de extensión local al teléfono: (509) 667-6540.